第 1 問

(1) 正の整数 k に対し、

$$A_k = \int_{\sqrt{k\pi}}^{\sqrt{(k+1)\pi}} |\sin(x^2)| \, dx$$

とおく。次の不等式が成り立つことを示せ。

$$\frac{1}{\sqrt{(k+1)\pi}} \le A_k \le \frac{1}{\sqrt{k\pi}}$$

(2) 正の整数 n に対し、

$$B_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_{\sqrt{n\pi}}^{\sqrt{2n\pi}} |\sin(x^2)| \, dx$$

とおく。極限 $\lim_{n o \infty} B_n$ を求めよ。

第 2 問

黒玉 3 個、赤玉 4 個、白玉 5 個が入っている袋から玉を 1 個ずつ取り出し、取り出した玉を順に横一列に 12 個すべて並べる。ただし、袋から個々の玉が取り出される確率は等しいものとする。

- (1) どの赤玉も隣り合わない確率 p を求めよ。
- (2) どの赤玉も隣り合わないとき、どの黒玉も隣り合わない条件付き確率 q を求めよ。

第 3 問

a を実数とし、座標平面上の点 (0,a) を中心とする半径 1 の円の周を C とする。

- (1) C が、不等式 $y>x^2$ の表す領域に含まれるような a の範囲を求めよ。
- (2) a は (1) で求めた範囲にあるとする。C のうち $x \ge 0$ かつ y < a を満たす部分を S とする。S 上の点 P に対し、点 P での C の接線が放物線 $y = x^2$ によって切り取られてできる線分の長さを L_P とする。 $L_Q = L_R$ となる S 上の相異なる 2 点 Q,R が存在するような a の範囲を求めよ。

第 4 問

座標空間内の 4 点 O(0,0,0)、A(2,0,0)、B(1,1,1)、C(1,2,3) を考える。

- $(1) \ \overrightarrow{OP} \perp \overrightarrow{OA}, \ \overrightarrow{OP} \perp \overrightarrow{OB}, \ \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC} = 1 \ e$ 満たす点 P の座標を求めよ。
- (2) 点 P から直線 AB に垂線を下ろし、その垂線と直線 AB の交点を H と する。 \overrightarrow{OH} を \overrightarrow{OA} と \overrightarrow{OB} を用いて表せ。
- (3) 点 Q を $\overrightarrow{OQ} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OP}$ により定め、Q を中心とする半径 r の球面 S を考える。S が三角形 OHB と共有点を持つような r の範囲を求め よ。ただし、三角形 OHB は 3 点 O,H,B を含む平面内にあり、周とそ の内部からなるものとする。

第 5 問

整式 $f(x) = (x-1)^2(x-2)$ を考える。

- (1) g(x) を実数を係数とする整式とし、g(x) を f(x) で割った余りを r(x) とおく。 $g(x)^7$ を f(x) で割った余りと $r(x)^7$ を f(x) で割った余りが等しいことを示せ。
- (2) a,b を実数とし、 $h(x) = x^2 + ax + b$ とおく。 $h(x)^7$ を f(x) で割った余りを $h_1(x)$ とおき、 $h_1(x)^7$ を f(x) で割った余りを $h_2(x)$ とおく。 $h_2(x)$ が h(x) に等しくなるような a,b の組をすべて求めよ。

第 6 問

O を原点とする座標空間において、不等式 $|x| \le 1$ 、 $|y| \le 1$ 、 $|z| \le 1$ の表す立方体を考える。その立方体の表面のうち、z < 1 を満たす部分を S とする。

以下、座標空間内の 2 点 A,B が一致するとき、線分 AB は点 A を表すものとし、その長さを 0 と定める。

- (1) 座標空間内の点 P が次の条件 (i), (ii) をともに満たすとき、点 P が動きうる範囲 V の体積を求めよ。
 - (i) $OP \leq \sqrt{3}$
 - (ii) 線分 OP と S は、共有点を持たないか、点 P のみを共有点に持つ。
- (2) 座標空間内の点 N と点 P が次の条件 (iii), (iv), (v) をすべて満たすとき、点 P が動きうる範囲 W の体積を求めよ。必要ならば、 $\sin\alpha=\frac{1}{\sqrt{3}}$ を満たす実数 α $(0<\alpha<\frac{\pi}{2})$ を用いてよい。
 - (iii) $ON + NP \leq \sqrt{3}$
 - (iv) 線分 ON と S は共有点を持たない。
 - (v) 線分 NP と S は、共有点を持たないか、点 P のみを共有点に持つ。